


Daryclox Gel



NÚMERO DE REGISTRO Q-7503-049

Antibiótico de amplio espectro

Para el periodo de lactación

Suspensión intramamaria



FÓRMULA:

Cada 10 ml contiene:

Cloxacilina sódica	200 mg
Neomicina sulfato	200 mg
Dexametasona	0.250 mg
Excipiente c.b.p.	10 ml

ESPECIES:

Bovinos y caprinos productores de leche



DESCRIPCIÓN E INDICACIONES:

Para el tratamiento de mastitis en hembras en producción láctea causadas por gérmenes sensibles a la fórmula.

DOSIS:

Vacas: administrar 10 ml (equivalente a 200 mg de cloxacilina sódica por cuarto tratado) cada 12 horas durante 2 días.

Cabras: administrar 5 ml (equivalente a 100 mg de cloxacilina sódica por medio tratado) cada 12 horas durante 1 o 2 días

Para lograr una mejor difusión del medicamento aplique un ligero masaje sobre la glándula mamaria

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramamaria

PRESENTACIÓN:

10 ml

Cubeta con 40 jeringas

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

TIEMPO DE RETIRO:

No destinar al consumo humano la leche de animales tratados hasta 72 horas posteriores a la última aplicación.

ADVERTENCIAS: No se deje al alcance de los niños ni de los animales domésticos.

Mantenga el producto en un lugar seco y fresco y protegido de la luz directa.

Para uso exclusivo veterinario.



SALUD Y BIENESTAR ANIMAL, S.A. DE C.V.

📍 Anaxágoras 1408, Santa Cruz Atoyac, CP. 03310, CDMX

☎ (55)8590.7348 al 51

✉ syba1@prodigy.net.mx