


Finadol



NÚMERO DE REGISTRO Q-7503-050

Antinflamatorio no esteroideal.

Solución inyectable



FÓRMULA:

Cada ml Contiene:
Flunixin de Meglumina 83 mg
Equivalente a 50 mg de flunixin base
Vehículo c.b.p. 1 ml

ESPECIES:

Bovinos productores de carne, bovinos productores de leche y equinos.



DESCRIPCIÓN E INDICACIONES:

Uso en bovinos y equinos para el tratamiento de inflamaciones y dolores asociados con alteraciones musculoesqueléticas e inflamación aguda asociada con enfermedades del tracto respiratorio.

En bovinos: útil en el tratamiento de neumonías, septicemias, mastitis y diarreas que causen inflamación, dolor y pirosis.

En equinos dolores viscerales asociados al cólico e inflamación muscular.

DOSIS:

Bovinos productores de carne y productores de leche 1 a 2 ml/45 kg de peso (1.1 a 2.2 mg/kg) cada 12 a 24 hrs, por un periodo de hasta cinco días consecutivos.

Equinos: 1 a 2 ml por cada 45 kg de peso (1.1 a 2.2 mg/kg) cada 12 a 24 horas de acuerdo con la severidad del caso.

El tratamiento puede ser repetido por periodo de hasta 4 días si reaparecen los síntomas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o Intravenosa

PERIODO DE RETIRO:

No administrar a animales de menos de 3 días de edad.

El periodo de retiro para la carne de los animales destinados para consumo humano después de la última aplicación del producto es:

Bovinos: 1 día

No consumir la leche de los animales tratados hasta 12 horas después de la última aplicación.




SALUD Y BIENESTAR ANIMAL, S.A. DE C.V.

📍 Anaxágoras 1408, Santa Cruz Atoyac, CP. 03310, CDMX

📞 (55)8590.7348 al 51

✉️ syba1@prodigy.net.mx

Finadol



NÚMERO DE REGISTRO Q-7503-050

Antinflamatorio no esteroidal.

Solución inyectable



ADVERTENCIAS:

No usar en equinos destinados al consumo humano. No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al flunixin. Evitar la inyección intraarterial a equinos, ya que pueden presentar reacciones adversas tales como: incoordinación, hiperventilación, histeria y debilidad muscular. Estos signos son pasajeros y desaparecen sin la necesidad de antídoto.

No exceder la dosis recomendada.

No mezclar con otras sustancias en la misma jeringa

La causa de la Inflamación del dolor o del cólico debe ser determinada y tratada paralelamente con la terapia adecuada.

No se deje al alcance de los niños ni de los animales domésticos.

Mantenga el producto en un lugar seco y fresco y protegido de la luz directa.

Para uso exclusivo veterinario.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 50 y 100 ml.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.